

Но если ко всему сказанному прибавить, что въ центральной Европѣ ячмень обыкновенно дороже овса, то едва ли можно сомнѣваться, что онъ не можетъ конкурировать съ нимъ.

На югѣ и востокѣ всеобщее употребленіе ячменя оправдывается не столько его высокими качествами, сколько тѣмъ, что разведеніе овса тамъ связано съ большими затрудненіями. Ячменная же мука, напротивъ, имѣетъ большую цѣну, какъ добавочный кормъ для отъемныхъ жеребятъ и заводскихъ матокъ и вообще лошадей, которыя вслѣдствіе болѣзней органовъ дыханія и пищеваренія сильно исхудали. Эта мука не только легко переваривается, но и очень питательна, почему ее и даютъ съ успѣхомъ лошадямъ, которыя по причинѣ переутомленія не въ состояніи извлечь себѣ пользу изъ другого корма. Ячменная мука легко становится затхлою и въ такомъ состояніи можетъ быть причиною серьезныхъ заболѣваній кишечнаго канала и коликъ; для предупрежденія этой порчи, ячменную муку сохраняютъ въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ. Хорошій ячмень долженъ быть тяжеловѣсенъ, крупень, съ глубокими бороздами вдоль зерна, блестящій, блѣдно-желтаго цвѣта, безъ запаха и безъ всякихъ постороннихъ примѣсей. При кормленіи ячменемъ обязательны ежедневныя движенія.

Практика рекомендуетъ передъ задачею ячменя дать лошади немного сѣна, потомъ напоить ее и лишь чрезъ часъ послѣ этого задавать ячмень; причемъ слѣдуетъ его задавать всегда на одну треть меньше овса.

Многіе коннозаводчики въ Россіи практикуютъ дачу ячменя во время случайнаго періода жеребцамъ-производителямъ, но это совершенно ошибочно, такъ какъ ячмень не только не повышаетъ половой похоти, но напротивъ — вызываетъ ожирѣніе, лѣнь и апатію.

Г р е ч и х а .

По своей питательности и удобоваримости гречиха (см. рис. 3) занимаетъ среднее мѣсто между овсомъ и ячменемъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ употребляютъ гречиху, какъ ежедневный кормъ для лошадей, причемъ обыкновенно задаютъ ее въ грубомъ помолѣ или мукѣ. Для достиженія достаточной эксплуатаціи безусловно необходимо, скамливая гречиху, разрываніе ея оболочки и размельченіе зерна. Въ послѣдней формѣ ея питательность мало отличается отъ ячменной муки. Кормленіе гречихой все-таки требуетъ нѣкоторой осторожности, такъ какъ отъ нея лошади сильнѣе обыкновеннаго потѣютъ и легко заболѣваютъ запоромъ и коликами, приливами крови къ головѣ и кромѣ того иногда покрываются узловатой сыпью. Практика не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что гречиха дѣлаетъ животныхъ болѣе мясистыми, чѣмъ сильными, и, если вообще можетъ быть пригодна, какъ кормъ лошадямъ, то только рабочимъ. Вредный кормъ вообще узнается по испражненіямъ: онѣ становятся кашцеобразной консистенціи и съ кислымъ запахомъ; въ такихъ случаяхъ надо немедленно пріостановить дачу корма, вызвавшаго такія испражненія.

Обыкновенный рационъ гречихи отъ 5 до 7¹/₂ ф. взаменъ того же количества овса, хотя, по мнѣнію ветеринарнаго врача г. Штаубе, при внимательномъ наблюдении за пищевареніемъ можно безъ всякаго опасенія давать ежедневно отъ 14 и даже до 17 фунт.

Въ Сибири, Китаѣ и восточномъ Туркестанѣ дико растеть татарская гречиха, называемая дикушкой и карликомъ. Кочующіе инородцы и бѣдные сибирскіе поселенцы собираютъ зерно съ дикоростущей гречихи и мелютъ въ муку, которую скармливаютъ лошадямъ, посыпая сѣчку изъ стеблей того же растенія.

По кормовому достоинству гречишная солома стоитъ выше соломы хлѣбныхъ злаковъ, но ниже соломы бобовыхъ, однако скармливать ее нужно съ большою осторожностью и въ небольшихъ дачахъ, иначе животныя заболѣваютъ „гречишной“ болѣзью, напоминающей собою рожу.



Рис. 3. Гречиха (*Fagopyrum esculentum*).

Р о ж ь.

У ржи (см. рис. 4 № 1—1 а), какъ корма для лошадей, немало недостатковъ, и въ Западной Европѣ рожь пользуется репутацией плохого кормового средства; однако въ Россіи, гдѣ приходится довольно часто ее скармливать лошадямъ, держатся нѣсколько иного взгляда на кормовое достоинство ржи.

Изъ наблюдений практиковъ видно, что рожь представляетъ собою довольно сильный по питательности кормъ, который, при скармливании съ извѣстными предосторожностями простымъ рабочимъ лошадямъ, можетъ считаться до извѣстной степени полезнымъ. Кормленія рожью лошади быстро наѣдаются себѣ твердое тѣло съ крѣпкими мускулами,

способными къ тяжелой и продолжительной работѣ; причемъ ожирѣніе, получаемое отъ ячменя, на примѣръ, не имѣетъ мѣста. Но, повторяемъ, съ этимъ кормомъ надо быть осторожнымъ: его можно давать только при условіи равномерной, болѣе или менѣе напряженной работы и только въ ограниченномъ количествѣ, такъ какъ рожь относится къ группѣ кормовыхъ веществъ, трудно перевариваемыхъ.

Если кормить лошадей ненадлежащимъ образомъ приготовленной рожью, то содержащаяся въ ней крахмалистая вещества взбухаютъ въ желудкѣ, и вслѣдствіе этого обнаруживается несвареніе пищи, колики, катарры, а иногда даже наступаетъ разрывъ желудка и кишечнаго канала. Трудной переваримости корма способствуетъ также находящаяся въ немъ клейковина.

Наибольшій вредъ отъ кормленія рожью наблюдается у взрослыхъ лошадей, когда онѣ стоятъ безъ работы. Кромѣ того замѣчено, что по-