

Итакъ, употребленіе такого корма можно посоветовать лишь для лошадей, утомленныхъ усиленной работой и для производителей, которыми пользовались слишкомъ усиленно во время случайнаго періода, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что для лошадей, страдающихъ воспаленіемъ копытъ и одышкою, этотъ кормъ безусловно вреденъ.

Скармливаемые осторожно конскіе бобы всегда обнаружатъ свои высокія питательныя качества и чрезвычайно умѣстны, если требуется содержать въ хорошемъ тѣлѣ старыхъ лошадей или скоро поправить сильно исхудавшихъ и по необходимости продолжающихъ работу. Въ такихъ случаяхъ прибавкой отъ 2¹/₂ до 3³/₄ ф. конскихъ бобовъ къ обыкновенной дачѣ овса достигаются удивительно благопріятные результаты.

Конскіе бобы не должны быть употребляемы въ кормъ свѣжими; необходимо ими пользоваться на слѣдующій годъ послѣ уборки съ поля, такъ какъ иначе они не только теряютъ въ питательности, но и легко могутъ вызвать колики. Вслѣдствіе крѣпкой оболочки зеренъ, затрудняющей процессъ пережевыванія и утомляющей челюстныя мышцы, бобы должно быть скармливаемы въ раздробленномъ или размяченномъ въ водѣ состояніи. Въ большомъ количествѣ бобовыя растенія не могутъ быть хорошо обработаны желудочнымъ сокомъ, отъ чего происходитъ разложеніе и, какъ спутникъ его—вспучиваніе и запоръ.

При употребленіи сухого гороха до взбуханія его въ желудкѣ нерѣдко происходятъ порѣзы, а вязущее вещество его оболочки вызываетъ запоръ. Горохъ собственно считается кормомъ, труднѣе перевариваемымъ и болѣе горячительнымъ, чѣмъ конскіе бобы, но въ Россіи корма эти мало употребляются и прежде всего по причинѣ ихъ дороговизны.

Морковь.

Морковь дѣйствуетъ послабляющимъ образомъ, вызываетъ усиленное отдѣленіе мочи и считается прекраснымъ діететическимъ кормомъ при простудныхъ страданіяхъ, катарахъ и болѣзняхъ пищеварительныхъ органовъ. Однако же, какъ постоянный кормъ, морковь не годится и въ особенности для лошадей, отъ которыхъ требуется быстрая и усиленная работа, такъ какъ она небогата веществомъ, образующимъ мускулы и вызываетъ отложеніе жира съ обильнымъ отдѣленіемъ пота.

Лошади, получающія морковь безъ примѣси овса, въ чистомъ видѣ, становятся скоро вялыми, много потѣютъ и нерѣдко страдаютъ коликами и кромѣ того, какъ показалъ опытъ англичанъ, обильно скармливаемая морковь вызываетъ сыпь. Въ общемъ считается за правило скармливать морковь въ равной долѣ съ овсомъ, причемъ такая смѣсь ничуть не уступаетъ своею питательностью чистому овсу, хотя, конечно, не потому что морковь по питательности равняется овсу, а потому, что она, дѣйствуя оживляющимъ образомъ на пищевареніе, даетъ возможность овсу лучше усваиваться.

Итакъ, хотя морковь не годится, какъ постоянный кормъ для лошадей, но она высоко цѣнится, какъ подсобный кормъ, въ особенности для

подсосныхъ матокъ и для лошадей, страдающихъ хроническимъ кашлемъ, безсиліемъ, плохимъ аппетитомъ, отдѣленіемъ твердыхъ каловыхъ массъ и другими болѣзнями пищеварительныхъ органовъ.

Лучше всего задавать морковь, разрѣзанную вдоль на тонкія части, разрубленную на возможно мелкіе куски и смѣшанную съ овсомъ. Нѣсколькихъ горстей мелко нарубленной моркови, прибавленной къ ежедневной дачѣ, достаточно для лошадей, совершающихъ постоянную работу. Жеребята же могутъ получать, смотря по возрасту, отъ 6 и до 12 фун. въ день, причемъ слѣдуетъ избѣгать моркови мороженой. Въ призовыхъ конюшняхъ и на заводахъ принято скармливать морковь осенью, въ продолженіе одного-двухъ мѣсяцевъ.

Картофель.

Хотя картофель и обладаетъ большою питательностью, употребленіе его въ кормъ лошадямъ весьма ограничено, такъ какъ онъ трудно переваривается и даже въ качествѣ подсобнаго корма легко можетъ быть причиной весьма вредныхъ послѣдствій. Въ сыромъ видѣ картофель особенно вреденъ, но и въ вареномъ можно совѣтовать имъ пользоваться только въ случаяхъ особой необходимости.

Уже одно то обстоятельство, что картофель можетъ вызвать выкидышъ, лишаетъ его всякаго интереса для коннозаводчиковъ. Если же необходимость заставляетъ пользоваться услугами картофеля, какъ подсобнаго корма для рабочихъ лошадей, то слѣдуетъ его задавать въ вареномъ или пареномъ видѣ съ примѣсью овса, ячменя или соломенной сѣчки.

Само собою разумѣется, что картофель долженъ быть безусловно здоровый, не тронутый морозомъ и не подвергшійся гніенію, но какъ ни выбирать его, какъ ни готовить, онъ все-же остается опаснымъ кормомъ, легко могущимъ вызвать у лошади цѣлый рядъ болѣе или менѣе серьезныхъ заболѣваній. При кормленіи картофелемъ нужно быть крайне осторожнымъ, задавая его сначала лишь въ самомъ незначительномъ количествѣ, прибавляя немного соли и поя лошадь до кормленія.

Нелишне замѣтить, что цѣлый или слишкомъ крупно разрѣзанный картофель легко можетъ застрять въ пищеводѣ и этимъ вызвать новую бѣду. Нѣмецкіе хозяева довольно благопріятно отзываються о кормленіи картофелемъ при соблюденіи всѣхъ указанныхъ выше предосторожностей. Въ литературѣ есть не мало указаній о самыхъ различныхъ способахъ его утилизаціи. Такъ—одинъ хозяинъ задавалъ своей лошади ежедневно по 15 ф. въ пареномъ видѣ съ прибавкою 8 ф. овса. Другой рекомендуетъ: хорошо промывъ клубни, разрѣзать ихъ на мелкія части, уложить въ бочку, налить водой; на слѣдующее утро, выпустивъ воду черезъ особое, имѣющееся въ нижней части бочки, отверстіе, дать картофелю отстояться и только въ продолженіе слѣдующихъ сутокъ задавать его лошадямъ, смѣшавъ съ сѣчкой и зерномъ.

Сливаемая съ картофеля вода содержитъ въ себѣ лишь самое ничтожное количество питательныхъ веществъ, но зато извлекаетъ изъ него