

цѣнное сѣно. Совершенно то же самое можно сказать и о растеніяхъ, скошенныхъ въ перезрѣломъ состояніи.

Второй укосъ даетъ сѣно въ значительной степени менѣе питательное, а потому для лошадей цѣнныхъ и совершающихъ тяжелыя работы оно мало пригодно; но если необходимость заставляетъ скармливать такое сѣно, то его слѣдуетъ задавать въ небольшихъ порціяхъ, смѣшивая при этомъ съ хорошимъ сѣномъ или, въ крайнемъ случаѣ, съ соломой.

Худо убранный сѣно, долго лежавшее на воздухѣ при сырой и дождливой погодѣ, легко узнать по его темному цвѣту и недостаточно сильному аромату. Такое сѣно, какъ утерявшее часть своихъ питательныхъ веществъ и нерѣдко покрытое различными грибками, а иногда иломъ и пескомъ, представляется не только мало пригоднымъ, но даже и вреднымъ. Вообще нечистаго, запылившагося, илистаго, заржавленнаго и заплѣсневѣлаго сѣна надо избѣгать, и, не давая лошадямъ, бросать прямо въ навозную кучу, если владѣлецъ лошадей желаетъ избѣгнуть ряда иногда весьма серьезныхъ заболѣваній, каковы: разстройство пищеваренія, гастрически-нервные страданія, кашель, одышка, у подсосныхъ матокъ болѣзни жеребятъ, а у жеребыхъ выкидыши.

Рис. 10. Пырей луговой (*Alopecurus pratensis*).

Песокъ въ небольшомъ количествѣ особеннаго вреда не приноситъ; но если его много и такое сѣно скармливается продолжительное время, то песокъ этотъ, скопляясь въ толстой кишкѣ, образуетъ вмѣстѣ съ кормомъ, такъ называемые песочные камни, производящіе тяжелые запоры. Если же приходится по тѣмъ или другимъ причинамъ скармливать испорченное сѣно, то пыльное необходимо предварительно перетрусить, смочить свѣжей водой, выжать и сейчасъ же скармливать; заплѣсневѣлое — нужно просушить, перебить, и худшую часть совершенно отбросить, затѣмъ присыпать растворомъ поваренной соли и уже тогда задавать въ кормъ; лучше,



Рис. 11. Гребенникъ (*Cynosurus cristatus*).

однако, если можно, смѣшать его съ соломой или давать въ видѣ рѣзки. Поваренная соль въ этомъ случаѣ нужна, во-первыхъ, для улучшенія вкуса и возбужденія перистальтики кишекъ, а во-вторыхъ, для того чтобы усиленіемъ обмѣна веществъ быстрѣе удалить вредныя начала изъ организма. Хотя надо добавить, что въ общемъ и такое улучшенное сѣно особой пользы не принесетъ и лучше его избѣгать.

Свѣжее сѣно нерѣдко вызываетъ колики и другія расстройства пищеваренія. Чѣмъ благороднѣе лошадь, тѣмъ болѣе она чувствительна къ неудобоваримости свѣжаго сѣна; но если за недостаткомъ старыхъ запасовъ приходится скармливать свѣжее, только

что убранный сѣно, то ради предосторожности слѣдуетъ давать его сначала вмѣстѣ со старымъ или съ соломой.

Очень старое сѣно имѣетъ меньшую удобоваримость: теряя свои самыя нѣжныя части, оно становится пыльнымъ, и этимъ обуславливается какъ плохое пищевареніе у лошади, такъ и развитіе хроническихъ бронхіальныхъ катарровъ. По мнѣнію магистра ветеринарныхъ наукъ Фишера, сѣно старше одного года становится съ теченіемъ времени все менѣе и менѣе питательнымъ, такъ какъ питательныя вещества, мало-по-малу, выщелачиваются, удаляются и отчасти разлагаются; такое сѣно имѣетъ желтоватую или темную окраску, оно сухо и ломко, не имѣетъ ни запаха ни вкуса.




Рис. 13. Дубровка пахучая, желтоцвѣтъ (*Anthoxanthum odoratum*).



Рис. 12. Тимофеева трава (*Phleum pratense*).

Въ ноябрѣ обыкновенно сѣно уже настолько вылежалось, что можетъ быть скармливаемо безъ всякаго риска.

Англійскіе тренеры, съ особой заботливостью ухаживающіе за своими лошадьми, обыкновенно начинаютъ скармливать новый запасъ сѣна спустя восемь мѣсяцевъ по уборкѣ его и считаютъ, что до года сѣно удер-