

вѣчаетъ такимъ образомъ: „За случной возрастъ обыкновенно принимается четырехлѣтній. Трехлѣтки, говорятъ, бываютъ еще недостаточно развиты, и ихъ физическое развитіе замедляется въ періодъ жеребости; жеребенокъ же, родившійся отъ еще не вполне сложившейся и недоразвитой матки, настолько слабъ, что не стоитъ его выращивать. Между тѣмъ со всѣми другими домашними животными въ этомъ отношеніи менѣе осторожны, и, намъ кажется, нельзя вполне согласиться съ безусловною необходимостью случать не ранѣе четырехъ лѣтъ“. Намъ кажется, скорѣе возможно признать за нормальный возрастъ — трехлѣтній, въ томъ предположеніи, что породная кобыла отличается скороспѣлостью и если она рационально питалась, не отстала въ развитіи вслѣдствіе какихъ-либо болѣзненныхъ причинъ, то къ этому возрасту обыкновенно совершенно развита. Къ тому же случной періодъ начинается не ранѣе 15-го февраля, и если трехлѣтнюю кобылу покрыть въ первый разъ, скажемъ, въ маѣ, то вторая половина жеребости наступитъ, когда ей уже будетъ три съ половиною года.

Опытъ показалъ, что не вполне сложившіяся трехлѣтнія кобылы подъ вліяніемъ жеребости быстро развиваются. Очевидно, что помимо усиленнаго аппетита у жеребой кобылы увеличивается энергія пищеваренія и наблюдается лучшее усвоеніе корма. Общеизвѣстенъ фактъ, что заводскія матки, нѣсколько лѣтъ холостившія, худѣютъ и слабѣютъ.

Само собою понятно, что при скудномъ питаніи, плохомъ уходѣ и непосильной работѣ, жеребость дурно отражается на ростѣ молодого животного и на свѣтъ появляется жалкій приплодъ; но разумная работа, способствуя въ данномъ случаѣ какъ сохраненію здоровья и увеличенію мышечной энергіи, такъ равно и правильному развитію, безъ всякаго сомнѣнія, полезнѣе и выгоднѣе, чѣмъ праздность, бездѣтельность и ожирѣніе. Надо помнить, что на сколько животное становится жирнѣе, на столько уменьшается количество его крови.

Для каждой матки выдающееся значеніе имѣетъ наилучшее развитіе молочной железы, обуславливающей лучшую молочность. Матки, доставляющія мало молока и притомъ нехорошаго качества, имѣютъ весьма небольшую цѣнность. Недостаточное питаніе новорожденнаго служитъ причиной слабой конституціи и вмѣстѣ съ тѣмъ располагаетъ организмъ ко многимъ тяжелымъ болѣзнямъ, свойственнымъ вообще жеребятъ.

По нашимъ наблюденіямъ кобыла, ожеребившаяся въ четыре года, будетъ лучшей матерью, чѣмъ та, которая въ этомъ возрастѣ впервые пойдетъ въ случку, а кобылы, еще позднѣе покрываемыя, кормятъ по большей части еще хуже. Явленіе это легко поддается научному объясненію. Какъ извѣстно, на величину и другія свойства какого-нибудь органа, да и всего организма можно оказывать наибольшее воздѣйствіе лишь тогда, когда весь организмъ еще находится въ періодѣ развитія. Слѣдовательно, когда молочная железа въ концѣ третьяго или въ началѣ четвертаго года призывается оплодотвореніемъ къ дѣятельности, она въ