

никакихъ возбуждающихъ средствъ, а всю зиму на немъ работали и два раза въ день тщательно чистили. Къ началу будущаго сезона жеребецъ сразу пошелъ въ случку и случалъ прекрасно, какъ опытный заводчикъ.

Но бываютъ случаи полового безсилія не временнаго характера и вышеуказанными мѣрами тутъ помочь нельзя. Изношенный организмъ нервнаго жеребца совсѣмъ не реагируетъ на ячмень, яйца и пшеничную кашу. Такихъ жеребцовъ еще нѣсколько лѣтъ назадъ приходилось выбраковывать изъ завода за негодностью. Но нынѣ ветеринарная медицина обогатилась новымъ средствомъ, прекрасно дѣйствующимъ при половой слабости.

Въ 1905 г. впервые на животныхъ былъ испытанъ іохимбинъ Шпигеля извѣстнымъ нѣмецкимъ ветеринаромъ Holterbach.

Въ настоящее время іохимбинъ часто употребляется въ ветеринаріи и всегда съ прекраснымъ результатомъ, на что имѣется не мало указаній и въ литературѣ.

Іохимбинъ Шпигеля выписывается изъ аптеки по такой формулѣ:
 „Іохимбина солянокислаго (для ветерин. употребленія). 2,0
 Дистиллированной воды 250,0
 Хлороформа 5 капель“.

Давать жеребцу ежедневно въ теченіе 3—4 дней передъ случкой 3—4 столовыхъ ложки въ день. Стоитъ такое лѣкарство около 20 руб.

Переходя затѣмъ къ опредѣленію причинъ безплодія кобылы, мы наталкиваемся, къ сожалѣнію, на очень ихъ длинный списокъ. Къ неглубоко гнѣздящимся и сравнительно легко устранимымъ причинамъ можно отнести слѣдующія: недостаточное здоровье ко времени случки, трудность акклиматизаціи, половая дисгармонія, т. е. антипатія къ вступающему въ актъ производителю и, наконецъ, случка въ слишкомъ молодомъ возрастѣ или предпринятая слишкомъ скоро послѣ напряженной работы (на скачкахъ или на бѣгахъ, напримѣръ).

Болѣе серьезныя причины безплодія могутъ быть сведены на ненормальныя отклоненія маточной шейки (cervix uteri), которыя препятствуютъ проникновенію мужского сѣмени или уничтожаютъ жизненность сѣменныхъ нитей; сюда принадлежатъ: суженія наружнаго или внутренняго края маточнаго рыльца; коническая, удлиненная форма шейки съ необыкновенно маленькимъ внутреннимъ каналомъ; разрывы шейки при жеребленіи, которые оставляютъ за собою рубцы, измѣняющіе нормальное ея строеніе и т. д. Сюда же отчасти относятся также аномаліи влагалища, напримѣръ, ненормальная чувствительность влагалища (vaginismus), слишкомъ широкая срамная щель и въ особенности болѣзненная выдѣленія влагалища. Если къ этому прибавить хроническое воспаленіе слизистой оболочки матки (endometritis), утолщенія или твердыя образованія на маткѣ и ея шейкѣ, смѣщенія матки и новообразованія въ яичникахъ, то полагаемъ, что не нужно больше доказательствъ, чтобы видѣть безплодіе кобылъ коренящимся въ такихъ причинахъ, которыя требуютъ терапевтическаго вмѣшательства. Если кобыла повторно и упорно остается