

### Жеребость.

Первые признаки, заставляющіе предполагать, что кобыла жереба, суть слѣдующіе: прекращеніе течки, измѣненіе въ поведеніи, какъ на примѣръ, меньшая щекотливость или, наоборотъ, повышенная раздражительность, возрастающій аппетитъ (охота къ корму) безъ соотвѣтствующей прибыли въ жирѣ и мясѣ и, наконецъ, бѣльшая округлость и болѣе глубокое опусканіе живота. Болѣе надежные признаки, однако, появляются только во второй половинѣ беременности и заключаются въ тѣхъ замѣтныхъ движеніяхъ, которыя обнаруживаетъ плодъ, особенно по утрамъ во время поенія холодной водой, при надавливаніи холодною ладонью руки праваго паха. Конечно, при этомъ эмпирическомъ изслѣдованіи не обходится иногда, особенно при неопытности, безъ ошибокъ. Абсолютно надежнымъ является поэтому только изслѣдованіе черезъ прямую кишку или влагалище. Еще позднѣе—къ 9-му мѣсяцу жеребости—нерѣдко появляются отечныя опухоли на заднихъ конечностяхъ, вымени и животѣ. Въ заключеніе увеличивается вымя, въ которое набирается молоко, которое сначала—прозрачно и желтовато, затѣмъ мало-по-малу густѣетъ и незадолго до жеребленія образуетъ на соскахъ, такъ называемыя, „смоляныя капли“. Если бы вымя начало преждевременно функционировать и даже наступило бы отдѣленіе молока, то заводчикъ долженъ ожидать грустнаго разочарованія, такъ какъ это суть признаки или преждевременныхъ родовъ или двойни, изъ которыхъ, вѣроятно, ни одинъ не выживетъ.

Явленія, которыя характеризуютъ приближеніе родовъ, суть слѣдующія: широкія тазовыя связки расслабляются и значительно опускаются (собственно углубляются), брюхо сильнѣе отвисаетъ, бока вваливаются, вымя сильнѣе опухаетъ, изъ припухшей срамной щели сочится слизистая жидкость и животныя обнаруживаютъ по большей части безпокойство. Приблизительно за 24—30 часовъ до жеребленія уже возможно выдоить изъ вымени немного молока.

При наступленіи момента родовъ нужно поставить кобылу въ широкое, хорошо устланное соломой стойло и расковать ее (если этого не сдѣлано раньше).

Обыкновенно періодъ беременности продолжается у кобылы  $48\frac{1}{2}$  недѣль, т. е. 340 дней или 11 мѣсяцевъ; Н. I. Hammond (St. Nicholas Rectory, Droitwich, England) имѣлъ кобылу, которая однажды была жереба въ продолженіе 13 мѣсяцевъ 11 дней (отъ 2 іюня 1884 г. до 14 іюля 1885 г.) и вообще жеребилась не менѣе, чѣмъ черезъ 12 мѣсяцевъ; однако болѣе старыя кобылы носятъ иногда 12 мѣсяцевъ; другія, напротивъ, жеребятся уже на  $10\frac{1}{2}$  мѣсяцѣ. Болѣе долгій періодъ беременности положительно предпочтительнѣе.

Таково нормальное теченіе (періоды) беременности.

Главная причина безрезультатности многихъ случекъ заключается безъ сомнѣнія въ томъ, что точное знаніе факторовъ, вліяющихъ на