

9) Когда убѣдятся въ смерти жеребенка, то конечно заботятся только о сохраненіи кобылы.

10) Кесарево сѣченіе (сопряженное съ убиваніемъ кобылы) можетъ быть примѣнимо развѣ только тогда, когда кобыла завѣдомо не можетъ произвести на свѣтъ здороваго жеребенка, когда вообще невозможны благополучные роды, когда констатированъ разрывъ матки, или, наконецъ, когда вслѣдствіе разрыва при жеребленіи во влагалище проходятъ внутренности.

Кромѣ этого можно посовѣтовать вообще большую осторожность при всѣхъ соотвѣтствующихъ манипуляціяхъ.

Особенно мы обращаемъ вниманіе на легкую возможность вывиха или даже перелома руки, вставленной въ узкое влагалище, когда кобыла быстро вскакиваетъ или ложится.

Уходъ за подсосной маткой и жеребенкомъ въ первые дни жизни.

Всегда является желательнымъ, чтобы кобыла тотчасъ послѣ выжеребки облизала жеребенка для очищенія отъ покрывающей его слизи; это важно еще въ томъ отношеніи, что возбуждаетъ дѣятельность кожи жеребенка и усиливаетъ вдыханіе, раздражая чувствительные кожные нервы. Если кобыла этого не дѣлаетъ, то пробуютъ возбудить ея материнскій инстинктъ тѣмъ, что спину жеребенка посыпаютъ немного мукой, отрубями или солью. Если же и это не достигаетъ цѣли, то ничего другого не остается, какъ только вытереть жеребенка мягкой губкой.

Слабыхъ жеребятъ съ очень слабой дѣятельностью сердца нужно облить холодной водой и растирать или, еще лучше, сдѣлать искусственное дыханіе для поднятія дѣятельности сердца.

Также благопріятнаго вліянія можно ожидать отъ влажной теплоты, для чего завертываютъ слабенькаго жеребенка въ полотняныя простыни, предварительно смоченныя въ водѣ 28° С. и крѣпко выжатыя, а затѣмъ покрываютъ легкимъ шерстянымъ одѣяломъ. Такая влажная теплота способствуетъ сохраненію собственнаго тепла слабенькаго животнаго, вызываетъ благотворное раздраженіе его кожи и возбуждаетъ сосудистые и дыхательные центры. Когда завертываніе уже сдѣлано, нужно позаботиться о доступѣ въ легкія и кровь здороваго атмосфернаго воздуха, для каковой цѣли удаляютъ скопившуюся въ носовой полости околоплодную жидкость черезъ высасываніе. Если нѣтъ подъ руками ветеринарнаго врача съ нужными для этого инструментами, то приходится производить эту неаппетитную операцію конюху.

Жеребенка кладутъ при этомъ на бокъ; конюхъ прикладываетъ ротъ къ одной изъ ноздрей, заткнувъ другую рукой, втягиваетъ въ себя воздухъ.—Вдуваніе воздуха слабому жеребенку, рекомендуемое многими учебниками, не можетъ быть одобрено въ виду связанной съ этимъ методомъ опасности отъ проникновенія въ полость легкихъ слизи и околоплодной жидкости.

Превосходные результаты даетъ по нашимъ наблюденіямъ также и слѣдующій способъ приведенія къ жизни. Жеребенку, болѣе недышащему и кажущемуся уже издохшимъ, вытягиваютъ съ силою нѣсколько разъ подрядъ языкъ изо рта; это вызываетъ сначала слабую, затѣмъ все болѣе и болѣе усиливающуюся икоту, послѣ которой начинается ускоренное дыханіе, постепенно принимающее нормальный характеръ. Чтобы вызвать первую икоту, нужно энергично тянуть за языкъ; иногда бываетъ также достаточно небольшого давленія пальца на свободную часть языка.

Крѣпкій жеребенокъ поднимается вскорѣ послѣ рожденія и ищетъ вымя матери. Если кобыла смирная, то можно, въ случаѣ надобности помочь въ этомъ жеребенку; если же кобыла—щекотлива или не позво-




Рис. 34.

Ошейникъ противъ кусанія.

ляетъ жеребенку сосать, то нужно оставить ихъ наединѣ. Обыкновенно тогда одерживаетъ верхъ материнская любовь, такъ что всѣ дальнѣйшія мѣры являются излишними.

Только тогда, когда жеребенокъ настолько слабъ, что не можетъ стоять самъ на ногахъ или когда кобыла не бросаетъ своего отвращенія къ кормленію его, можно рекомендовать накладываніе щипцовъ, поднятіе одной изъ переднихъ ногъ, подвѣшиваніе жеребенка къ соскамъ и въ случаѣ надобности надаивать ему въ ротъ молоко. „Нѣсколько лѣтъ тому назадъ у меня—пишетъ гр. Врангель—была кобыла, которая только послѣ примѣненія особенныхъ принудительныхъ мѣръ начала исполнять свои материнскія обязанности.

„Эта кобыла была очень смирная. Пока кто нибудь стоялъ у ея головы или вообще около нея, она позволяла жеребенку спокойно ее сосать, но какъ только оставалась одна, она начинала бить жеребенка. Для устраненія этого, я обвязывалъ вокругъ шеи веревку, оба конца ко-

торой протягивались къ заднимъ путамъ, такъ что кобыла могла двигаться впередъ только маленькими шагами. Лишенная такимъ образомъ возможности лягаться, она стала кусаться. Противъ этого помогъ ошейникъ (рис. 34), но только пока онъ былъ надѣтъ; стоило его снять, чтобы кусаніе возобновлялось. Такое поведеніе кобылы повело въ результатъ къ тому, что жеребенка пришлось спасать подкармливаніемъ коровьимъ молокомъ.

„Наконецъ, я сталъ гонять непослушную кобылу на вблизи расположенное пастбище и приказалъ ее приводить къ жеребенку только три раза въ день. Съ этого момента ея отвращеніе и антипатія къ жеребенку сразу прошли: она была, повидимому, рада освобожденію вымени отъ избытка молока и уже спустя три недѣли стала заботливою и нѣжною кормилицею“.

Если вымя переполнено и потому болѣзненно, то нужно осторожно его выдоить. Противъ опухоли вымени (поверхностное воспаленіе вымени) помогаютъ холодныя примочки, а также обмываніе растворомъ борной кислоты. Послѣ обмыванія, вымя нужно хорошо вытереть книзу.

Первое, отдѣляющееся послѣ родовъ молоко кобылы имѣетъ полезное, слегка послабляющее свойство и предназначено природою къ тому, чтобы освободить жеребенка отъ каловыхъ массъ, накопившихся предъ рожденіемъ въ его кишкахъ. Если молоко не оказываетъ такого дѣйствія, то ставятъ теплый клистиръ, или даютъ столовую ложку разбавленной водою ревеневой настойки (Tinct. Rhei); впрочемъ, иногда предпочитаютъ просто вставлять тоненькую сальную свѣчку въ задній проходъ—почти всегда (особенно при безрезультатныхъ потугахъ жеребенка) дѣйствительное средство.

Тотчасъ послѣ жеребленія очень полезно давать кобылѣ пойло, приготовляемое цѣлесообразнѣе всего по англійскому рецепту такъ: 200 граммовъ овсяной муки разбалтываютъ въ холодной водѣ до консистенціи густыхъ сливокъ и, прокипятивъ затѣмъ въ продолженіе 5 минутъ въ 4,5 литрахъ воды, даютъ остыть. Три часа спустя послѣ этого дается хорошая дача овса. Для питья даютъ воду, взболтанную съ небольшимъ количествомъ муки. Обыкновенно кобылы послѣ выжеребки обнаруживаютъ большую жажду и этому препятствовать не слѣдуетъ, только бы вода была чиста и не слишкомъ холодна. Кобылу держать въ теплѣ, берегутъ отъ сквозного вѣтра и кормятъ—по крайней мѣрѣ, въ продолженіе первыхъ четырехъ недѣль—скорѣе скудно, чѣмъ обильно; впрочемъ, если отдѣленіе молока недостаточно, то слѣдуетъ кормъ усилить. Ячменная мука, а также вареное льняное сѣмя, морковь и отруби—какъ показалъ опытъ—способствуютъ большому отдѣленію молока.

Неоднократно дѣлались попытки поить жеребятъ плохо кормящихся кобылъ разбавленнымъ коровьимъ молокомъ, но не всегда жеребята пьютъ его и, во всякомъ случаѣ, большихъ страданій и долгаго времени стоитъ приучить ихъ къ этому. Напротивъ, почти всѣ жеребята охотно ѣдятъ теплую ячменную кашу, смѣшанную съ небольшимъ количествомъ

свѣжаго коровьяго молока. Такой супъ изъ ячменной каши повидимому настолько похожъ на кобылье молоко и по вкусу и по своимъ дѣйствіямъ, что жеребята не только охотно его ѣдятъ, но и растутъ при этомъ такъ же хорошо, какъ и при сосаніи кобыль. Кормленіе ячменнымъ супомъ имѣетъ большія преимущества: 1) въ рабочее время можно обходиться безъ материнскаго молока и 2) можно раньше отнять жеребенка.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда кобыла падетъ во время или послѣ выжеребки, ничего другого не остается, какъ кормить жеребенка изъ бутылки. Къ коровьему, (если можно, то лучше къ козьему) снятому молоку при этомъ прибавляютъ немного сахара (на 1 литръ молока — столовую ложку сахара), нагрѣваютъ его приблизительно до 28° С. и поятъ имъ изъ бутылки или какого-нибудь открытаго сосуда 5 — 6 разъ въ день. Необходимо всегда наблюдать, чтобы жеребенокъ напивался досыта, причемъ никогда не слѣдуетъ оставлять до слѣдующаго раза того, что не выпито, такъ какъ холодное и отстоявшееся молоко дѣйствуетъ вредно. Очень облегчается выкармливаніе изъ бутылки, если приучить жеребенка сосать изъ резинового соска, причемъ конечно необходимо его держать въ абсолютной чистотѣ. Для послѣдней цѣли сосокъ послѣ основательной чистки кладутъ въ чистую воду. Кромѣ коровьяго молока, даютъ также и упомянутый ячменный супъ.

Очень хорошо прибавлять къ снятому молоку слизистый отваръ льняного сѣмени, сначала только по чайной ложечкѣ, а затѣмъ все больше и больше.

Выращиваніе жеребенка.

Въ продолженіе трехъ первыхъ недѣль жизни жеребенокъ питается естественнымъ путемъ. Послѣ этого его можно и даже должно приучать къ раздавленному овсу, нѣжному сѣну и въ случаѣ, если кобыла — плохая кормилица, къ ячменной кашкѣ, которую кладутъ въ особія маленькія ясли и защищаютъ прибитыми наглухо планками отъ кобылы. Здоровые жеребята начинаютъ уже въ 14-дневномъ возрастѣ подбирать зерна овса, а спустя нѣсколько недѣль они съѣдаютъ 2,5 литра. Лучше давать раздавленнымъ, такъ какъ съ одной стороны пищеварительные органы такого молодого животнаго еще не въ состояніи усваивать цѣлый овесъ, съ другой же стороны напряженіе при жеваніи твердыхъ зеренъ можетъ скоро повести къ болѣзненному ощущенію въ нѣжной еще жевательной мышцѣ и скоро положить, такимъ образомъ, конецъ употребленію овса.

Самыми обыкновенными болѣзнями жеребенка въ періодъ сосанія являются: діарея (поносъ), суставоломъ и глисты. Противъ первой помогаютъ сырыя яйца, даваемая со скорлупой, и глицеринъ, прибавляемый къ водѣ для питья, вторая же болѣзнь представляется настолько серьезной и опасной, что требуетъ болѣе подробнаго описанія. Суставоломъ жеребятъ проявляется вообще въ 2-хъ формахъ: въ видѣ воспаления суставовъ или въ видѣ жирового перерожденія мышцъ и органовъ.