

свѣжаго коровьяго молока. Такой супъ изъ ячменной каши повидимому настолько похожъ на кобылье молоко и по вкусу и по своимъ дѣйствіямъ, что жеребята не только охотно его ѣдятъ, но и растутъ при этомъ такъ же хорошо, какъ и при сосаніи кобыль. Кормленіе ячменнымъ супомъ имѣетъ большія преимущества: 1) въ рабочее время можно обходиться безъ материнскаго молока и 2) можно раньше отнять жеребенка.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда кобыла падетъ во время или послѣ выжеребки, ничего другого не остается, какъ кормить жеребенка изъ бутылки. Къ коровьему, (если можно, то лучше къ козьему) снятому молоку при этомъ прибавляютъ немного сахара (на 1 литръ молока — столовую ложку сахара), нагрѣваютъ его приблизительно до 28° С. и поятъ имъ изъ бутылки или какого-нибудь открытаго сосуда 5 — 6 разъ въ день. Необходимо всегда наблюдать, чтобы жеребенокъ напивался досыта, причемъ никогда не слѣдуетъ оставлять до слѣдующаго раза того, что не выпито, такъ какъ холодное и отстоявшееся молоко дѣйствуетъ вредно. Очень облегчается выкармливаніе изъ бутылки, если приучить жеребенка сосать изъ резинового соска, причемъ конечно необходимо его держать въ абсолютной чистотѣ. Для послѣдней цѣли сосокъ послѣ основательной чистки кладутъ въ чистую воду. Кромѣ коровьяго молока, даютъ также и упомянутый ячменный супъ.

Очень хорошо прибавлять къ снятому молоку слизистый отваръ льняного сѣмени, сначала только по чайной ложечкѣ, а затѣмъ все больше и больше.

Выращиваніе жеребенка.

Въ продолженіе трехъ первыхъ недѣль жизни жеребенокъ питается естественнымъ путемъ. Послѣ этого его можно и даже должно приучать къ раздавленному овсу, нѣжному сѣну и въ случаѣ, если кобыла — плохая кормилица, къ ячменной кашкѣ, которую кладутъ въ особія маленькія ясли и защищаютъ прибитыми наглухо планками отъ кобылы. Здоровые жеребята начинаютъ уже въ 14-дневномъ возрастѣ подбирать зерна овса, а спустя нѣсколько недѣль они съѣдаютъ 2,5 литра. Лучше давать раздавленнымъ, такъ какъ съ одной стороны пищеварительные органы такого молодого животнаго еще не въ состояніи усваивать цѣлый овесъ, съ другой же стороны напряженіе при жеваніи твердыхъ зеренъ можетъ скоро повести къ болѣзненному ощущенію въ нѣжной еще жевательной мышцѣ и скоро положить, такимъ образомъ, конецъ употребленію овса.

Самыми обыкновенными болѣзнями жеребенка въ періодъ сосанія являются: діарея (поносъ), суставоломъ и глисты. Противъ первой помогаютъ сырыя яйца, даваемая со скорлупой, и глицеринъ, прибавляемый къ водѣ для питья, вторая же болѣзнь представляется настолько серьезной и опасной, что требуетъ болѣе подробнаго описанія. Суставоломъ жеребятъ проявляется вообще въ 2-хъ формахъ: въ видѣ воспаления суставовъ или въ видѣ жирового перерожденія мышцъ и органовъ.