

марта и начала апрѣля) жеребята рѣже подвергаются заболѣванію хромотой, чѣмъ поздне.

Что касается до приведеннаго въ числѣ причинъ, вызывающихъ суставоломъ жеребятъ, неподходящаго состава молока, то нужно замѣтить, что молоко легко скисаетъ, если оно задерживается въ вымени слишкомъ долго или если кобыла во время работы очень разгорячится. Подобныя же измѣненія обнаруживаетъ молоко послѣ сильнаго возбужденія кобылы во время течки, а также при лихорадочныхъ болѣзняхъ и воспаленіяхъ вымени. Если молоко слишкомъ жирно, то кобылу переводятъ на кормъ, менѣе богатый азотомъ, освѣжающій и слегка слабительный, въ другихъ же приведенныхъ здѣсь случаяхъ ничего другого не остается, какъ только выдаивать кобылу. Изъ этого слѣдуетъ, что въ продолженіе первыхъ 2—3 недѣль (послѣ выжеребки) не слѣдуетъ надолго отлучать жеребенка отъ кобылы, такъ какъ, во-первыхъ, тоска по жеребенку неблагоприятно отзывается на качествѣ молока матери, во-вторыхъ, — въ вымени долго бывшей на работѣ кобылы собирается обыкновенно много молока, которое можетъ легко принести вредъ жеребенку, набрасывающемуся на него въ такихъ случаяхъ съ жадностью.

Противъ глистовъ, къ сожалѣнію, еще не открыто радикальнаго и безвреднаго средства; большою извѣстностью пользуются въ ветеринаріи „сантониновыя пилюли“ (дневная доза — 1—6 сантиграммовъ). Сначала въ продолженіе 5—6 дней даютъ эти пилюли, а затѣмъ слабительное изъ кастороваго масла или рвотнаго камня, послѣ чего, какъ утверждаютъ, выходитъ множество глистовъ. Извѣстный французскій иппологъ Du Hauss советуетъ слѣдующее, по его увѣреніямъ, прекрасное средство: 20 литровъ ржи сушатъ въ хлѣбной печи, пока она не приметъ цвѣта кофейныхъ зеренъ, затѣмъ, прибавивъ 500 граммовъ соли, даютъ разбухнуть въ кипящей водѣ; приготовленнаго такимъ образомъ хлѣба прибавляютъ вмѣстѣ съ овсомъ, отрубями или мукою къ каждому корму, отъ чего, по словамъ Du Hauss, уже по прошествіи нѣсколькихъ дней выходитъ масса глистовъ. Средства этого мы не испытывали, но думаемъ, что въ виду извѣстности и опытности упомянутаго автора оно заслуживаетъ нѣкотораго вниманія (см. также примѣчаніе на стр. 652 томъ I). О лѣченіи мыта мы уже говорили въ своемъ мѣстѣ. (см. стр. 653 т. I).

Отнятіе отъ матери имѣетъ значительное вліяніе на развитіе жеребенка, и, благодаря перемѣнѣ въ пищѣ, можетъ вызвать болѣе или менѣе продолжительную остановку (паузу) въ общемъ развитіи молодого организма; послѣдняго поэтому должно по возможности избѣгать.

Съ другой стороны, нельзя конечно упускать изъ виду того, что молоко матери приноситъ неоцѣнимую пользу для здоровья и развитія жеребенка.

Слишкомъ короткій періодъ кормленія материнскимъ молокомъ можетъ повести къ весьма неблагоприятнымъ послѣдствіямъ; наоборотъ, и слишкомъ продолжительный періодъ затрудняетъ опредѣленіе кормовой нормы, соотвѣтствующей прогрессирующему развитію жеребенка. Въ обоихъ случаяхъ организму наносится извѣстный ущербъ.