

Поэтому заводчику необходимо имѣть въ виду, что увеличить массу лошадиной породы можно только путемъ соотвѣтствующаго кормленія. Чтобы ускорить этотъ процессъ, нѣмцы не останавливались предъ затратами, связанными съ ввозомъ тяжелаго заводскаго матеріала, и никто не станетъ оспаривать рациональности этой мѣры. Если же мы при выращиваніи не придаемъ достаточнаго значенія положенію: „природа создаетъ жеребенка, а лошадь даетъ — человѣкъ“, то мы придемъ скоро къ печальному выводу, что конечнымъ результатомъ дорогаго ввоза получается порода лошадей, которая, не обладая большой практической примѣнностью, является и менѣ стойкой и значительно болѣе требовательной сравнительно съ нашими собственными туземными породами.

Переходя къ выращиванію облагороженныхъ породъ, мы позволимъ себѣ замѣтить, что положеніе большинства нашихъ иппологическихъ учебниковъ: „не жалѣйте овса“, примѣнимо только къ кормленію жеребятъ, не достигшихъ однолѣтняго возраста. Такъ какъ жеребенокъ на первомъ году растетъ больше, чѣмъ во весь послѣдующій періодъ развитія, то кормъ долженъ оказывать особенно сильное вліяніе на естественное развитіе нѣжнаго организма именно въ этотъ періодъ его наибольшаго роста. Такъ какъ отсюда также выходитъ, что молоко кобылы можетъ быть замѣняемо только однимъ овсомъ, то для жеребенка дѣйствительно представляется вопросомъ жизни, чтобы заводчикъ не жалѣлъ овса въ продолженіе перваго года.

Раціонъ въ 350 гр. съ рожденія до шестинедѣльнаго возраста, затѣмъ, во всевозрастающей пропорціи, — $2\frac{1}{2}$ фунта, а послѣ отнятія отъ матери и до 2-го года — по $7\frac{1}{2}$ ф. овса вмѣстѣ съ хорошимъ сѣномъ и по возможности питательной соломой — является необходимымъ для безпрепятственнаго развитія жеребенка, благородной породы. На второмъ и третьемъ году, наоборотъ, овесъ является не только лишнимъ, но даже вреднымъ, не говоря уже о невыгодности такого кормленія для заводчика. Вредъ овса заключается въ томъ, что жеребенокъ чрезмерно вытягивается въ вышину и становится настолько горячимъ, что только путемъ очень сильнаго моціона можно сдержать его въ соотвѣтствующихъ (должныхъ) границахъ. Такъ какъ мы и отъ полукровной лошади должны требовать извѣстныхъ размѣровъ въ ширину и глубину и такъ какъ для мелкихъ заводчиковъ рѣдко представляется возможность доставлять жеребятамъ должное движеніе, которое бы регулировало горячительное дѣйствіе овсянаго корма, то всегда слѣдуетъ изъ предосторожности при кормленіи 2-хъ и 3-хъ лѣтнихъ жеребятъ быть экономнымъ съ овсомъ. Если, наоборотъ, жеребятамъ на 2-мъ и 3-мъ году давать обильныя дачи овса, то они по большей части развиваются въ тонкихъ лошадяхъ, съ высокими ногами и нервныхъ, которыя подвержены обыкновенно костнымъ заболѣваніямъ, наростамъ, и впоследствии, когда приступаютъ къ работѣ, они доставляютъ много хлопотъ. То обстоятельство, что выращиваніе обходится дороже рыночной цѣнности, касается, конечно, лишь одного заводчика, мы же не должны забывать того, что