

внѣшнимъ причинамъ принадлежитъ: неправильный уходъ за копытами, слѣдствіемъ чего является неблагоприятное вліяніе сухости, сырости или нечистоты, а также неправильнаяковка, напимѣрь: примѣненіе къ широкимъ копытамъ подковъ съ горизонтальнымъ подошвеннымъ краемъ, слишкомъ крѣпкое притягиваніе гвоздей при заклепываніи, неравноѣрное прилаживаніе подковы и т. д. Стѣнка можетъ отдѣлиться также вслѣдствіе черезчуръ сыро содержаннаго копыта, усиленной работы на твердой почвѣ, чрезмѣрно расчищенной подошвы и подошвеннаго края, прижиганія бѣлой линіи при пригонкѣ подковъ и т. д. Пустая стѣнка, напротивъ, является слѣдствіемъ болѣзненныхъ процессовъ въ мясной стѣнкѣ, гнойныхъ наминокъ, заволоковъ и т. д.

*Лѣченіе.* Сращеніе отдѣлившихся частей роговой стѣнки и подошвы, конечно, невысмыслимо. Отдѣлившаяся стѣнка излѣчивается такимъ образомъ, что образовавшаяся полость отрастаетъ, другими словами, заполняется вновь отросшимъ плотнымъ рогомъ. Главная задача лѣченія заключается, слѣдовательно, въ томъ, чтобы предохранить вновь отрастающій рогъ отъ разъединенія. Съ этой цѣлью необходимо тщательно очистить всѣ пустыя мѣста отъ рыхлаго рога и другихъ нечистотъ, заполнить ихъ какимъ-либо мягкимъ клейкимъ веществомъ, какъ напимѣрь, древесной смолой, венеціанскимъ терпентиномъ, дегтемъ (искусственный рогъ Дефая, вслѣдствіе твердости, непригоденъ) или паклей, чтобы никоимъ образомъ въ этихъ мѣстахъ не могли снова накопляться песокъ, грязь, мелкіе камни или что-либо въ этомъ родѣ. Кромѣ того необходимо, конечно, устранить внѣшнія причины, если онѣ извѣстны. Чтобы предупредить дальнѣйшее отдѣленіе этой стѣнки кверху, нужно расчистить подошвенный край въ отдѣлившемся мѣстѣ такимъ образомъ, чтобы онъ не соприкасался съ подковой. На подковѣ безъ шиповъ слѣдуетъ сдѣлать широкою верхнюю поверхность; при копытахъ съ очень косыми стѣнками эта поверхность должна быть нѣсколько скошена внутрь и на подковѣ должны быть затянуты боковые отвороты. Вбиванія гвоздей въ отдѣлившуюся стѣнку слѣдуетъ, конечно, избѣгать. При сильномъ отдѣленіи стѣнки, распространившемся на большую часть подошвеннаго края, совѣтуютъ примѣненіе круглой подковы.

Съ пустой стѣнкой поступаютъ такимъ же образомъ. Но такъ какъ эта болѣзнь неизлѣчима, то лѣченіемъ стоитъ добиваться лишь предупрежденія слишкомъ дурныхъ послѣдствій. Къ сожалѣнію, у лошадей, быстро работающихъ, въ этомъ отношеніи немногаго можно достигнуть. Кровный жеребецъ „Креси“, тренировку котораго въ Москвѣ мы имѣли случай наблюдать изо дня въ день, страдалъ пустой стѣнкой праваго копыта, и хотя этого жеребца лѣчили по всѣмъ правиламъ искусства, достаточно было нѣсколько твердаго грунта, чтобы сдѣлать его, если не совсѣмъ неспособнымъ къ состязанію, то, по крайней мѣрѣ, менѣе увѣреннымъ на ходу.

*Гниеніе стрѣлки* заключается въ гнилостномъ разложеніи рога стрѣлки, которое, начиная отъ средней бороздки, распространяется оттуда и на сосѣднія части стрѣлки. Ближайшимъ слѣдствіемъ этого процесса бываетъ

то, что стрѣлка становится мягкой, рыхлой, трескается и выдѣляетъ дурно пахнущую, сѣробѣлую жидкость, которая все болѣе и болѣе разрушаетъ рогъ и можетъ, въ концѣ концовъ, привести къ полному обнаженію мясной стрѣлки. Болѣзнь, достигшая этой степени развитія, причиняетъ обыкновенно хромоту, болѣе или менѣе рѣзко выраженную. Очень часто слѣдствіемъ гніенія стрѣлки являются кольца, распространяющіяся косо, снизу и сзади, кверху и впередъ. По этимъ кольцамъ можно судить о присутствіи болѣзни, даже не поднимая ноги.

Гніеніе стрѣлки очень обычная болѣзнь, которая бываетъ то на одной, то на нѣсколькихъ, то на всѣхъ четырехъ ногахъ. Заднія ноги, однако, страдаютъ этою болѣзью гораздо чаще, чѣмъ переднія.

Если болѣзнь не слишкомъ развилась, лѣченіе не представляетъ особыхъ затрудненій. Въ противоположномъ же случаѣ предсказанія менѣе благоприятны; продолжительное гніеніе стрѣлки ведетъ часто къ образованію сжатого копыта.

*Причины.* Такъ какъ гніеніе стрѣлки, какъ показываетъ самое названіе, есть гнилостный процессъ, то главной причиной этой болѣзни болѣею частью является нечистота. Кромѣ того, къ обычнымъ причинамъ гніенія стрѣлки слѣдуетъ причислить: индивидуальное предрасположеніе, продолжительное стояніе въ конюшнѣ, ковку на высокіе шипы, слишкомъ высокія пятки и боковыя стѣнки, сильное срѣзываніе стрѣлки и сжатія копыта. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что для поддержанія стрѣлки въ здоровомъ состояніи необходимо ея постоянное соприкосновеніе съ почвой во время работы лошади; а потому отсутствіе работы является самой важной предрасполагающей причиной гніенія стрѣлки.

*Лѣченіе.* Первымъ условіемъ успѣшнаго лѣченія должна быть образцовая чистота. Поэтому бороздки стрѣлки слѣдуетъ очищать часто мокрой щеткой и потомъ примѣнить какое-нибудь антисептическое высушивающее средство, какъ на примѣръ: квасцы, мѣдный, желѣзный или цинковый купоросъ, растворъ карболовой кислоты (10 — 20% въ спиртѣ), танинъ и т. п. По этому поводу мы все-таки должны замѣтить, что металлическія средства, особенно концентрированный растворъ мѣднаго купороса, помимо неоспоримой лѣчебной силы, обладаютъ не-пріятнымъ свойствомъ разрыхлять копытный рогъ и стягивать мягкія части.

Въ всякомъ случаѣ, даже если процессъ не зашелъ особенно глубоко, необходимо ножомъ удалить всѣ гніющія части, чтобы не осталось ни одного гнилого пятнышка. Съ этой цѣлью иногда приходится удалять бѣольшую часть стрѣлки и даже при кровотеченіи. Однако, передъ этимъ останавливаться нечего: стрѣлка вырастетъ и вырастетъ нормальная; если же мы оставимъ гніющіе фокусы, въ которыхъ гнѣздятся гнилостныя бактеріи, то отъ процесса гніенія не избавимся и стрѣлка въ концѣ концовъ атрофируется. Послѣ удаленія гніющаго рога слѣдуетъ стрѣлку залить, а лучше приложить паклю, смоченную настоемъ арники, дегтя, скипидара и т. п. дезинфекціоннымъ средствомъ. Для удобства удержанія