

то, что стрѣлка становится мягкой, рыхлой, трескается и выдѣляетъ дурно пахнущую, сѣробѣлую жидкость, которая все болѣе и болѣе разрушаетъ рогъ и можетъ, въ концѣ концовъ, привести къ полному обнаженію мясной стрѣлки. Болѣзнь, достигшая этой степени развитія, причиняетъ обыкновенно хромоту, болѣе или менѣе рѣзко выраженную. Очень часто слѣдствіемъ гніенія стрѣлки являются кольца, распространяющіяся косо, снизу и сзади, кверху и впередъ. По этимъ кольцамъ можно судить о присутствіи болѣзни, даже не поднимая ноги.

Гніеніе стрѣлки очень обычная болѣзнь, которая бываетъ то на одной, то на нѣсколькихъ, то на всѣхъ четырехъ ногахъ. Заднія ноги, однако, страдаютъ этою болѣзнью гораздо чаще, чѣмъ переднія.

Если болѣзнь не слишкомъ развилась, лѣченіе не представляетъ особыхъ затрудненій. Въ противоположномъ же случаѣ предсказанія менѣе благоприятны; продолжительное гніеніе стрѣлки ведетъ часто къ образованію сжатого копыта.

Причины. Такъ какъ гніеніе стрѣлки, какъ показываетъ самое названіе, есть гнилостный процессъ, то главной причиной этой болѣзни болѣею частью является нечистота. Кромѣ того, къ обычнымъ причинамъ гніенія стрѣлки слѣдуетъ причислить: индивидуальное предрасположеніе, продолжительное стояніе въ конюшнѣ, ковку на высокіе шипы, слишкомъ высокія пятки и боковыя стѣнки, сильное срѣзываніе стрѣлки и сжатія копыта. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что для поддержанія стрѣлки въ здоровомъ состояніи необходимо ея постоянное соприкосновеніе съ почвой во время работы лошади; а потому отсутствіе работы является самой важной предрасполагающей причиной гніенія стрѣлки.

Лѣченіе. Первымъ условіемъ успѣшнаго лѣченія должна быть образцовая чистота. Поэтому бороздки стрѣлки слѣдуетъ очищать часто мокрой щеткой и потомъ примѣнить какое-нибудь антисептическое высушивающее средство, какъ на примѣръ: квасцы, мѣдный, желѣзный или цинковый купоросъ, растворъ карболовой кислоты (10 — 20% въ спиртѣ), танинъ и т. п. По этому поводу мы все-таки должны замѣтить, что металлическія средства, особенно концентрированный растворъ мѣднаго купороса, помимо неоспоримой лѣчебной силы, обладаютъ не-пріятнымъ свойствомъ разрыхлять копытный рогъ и стягивать мягкія части.

Въ всякомъ случаѣ, даже если процессъ не зашелъ особенно глубоко, необходимо ножомъ удалить всѣ гніющія части, чтобы не осталось ни одного гнилого пятнышка. Съ этой цѣлью иногда приходится удалять большую часть стрѣлки и даже при кровотеченіи. Однако, передъ этимъ останавливаться нечего: стрѣлка вырастетъ и вырастетъ нормальная; если же мы оставимъ гніющіе фокусы, въ которыхъ гнѣздятся гнилостныя бактеріи, то отъ процесса гніенія не избавимся и стрѣлка въ концѣ концовъ атрофируется. Послѣ удаленія гніющаго рога слѣдуетъ стрѣлку залить, а лучше приложить паклю, смоченную настоемъ арники, дегтя, скипидара и т. п. дезинфекціоннымъ средствомъ. Для удобства удержанія

пакли и, во избѣжаніе загрязненія обнаженной стрѣлки, можно привинтить шипами къ подковѣ металлическую пластинку.

Дальнѣйшія необходимыя мѣры заключаются въ снятіи слишкомъ высокихъ пятокъ, педантичной чистотѣ, обильной сухой подстилкѣ, соотвѣтствующей ковкѣ и достаточномъ движеніи. Достойно вниманія, что гніеніе стрѣлки крайне рѣдко случается у некованныхъ лошадей. Отсутствіе подковъ, особенно на пастбищѣ, при атрофіи стрѣлки и сжатыхъ стѣнкахъ, много способствуетъ возстановленію здоровой стрѣлки.

Какъ послѣдующее лѣченіе, Мёллеръ совѣтуетъ смазываніе дегтемъ или карболовымъ масломъ (1:10). Во всякомъ случаѣ, предшествующее лѣченіе не должно быть прекращено прежде, чѣмъ рогъ не получитъ здороваго вида. Если стрѣлка слишкомъ разрушена, то дезинфекціонныя средства лучше примѣнять въ жидкомъ видѣ, причемъ жидкость вливается въ трещины стрѣлки и пропитанная тѣмъ же самымъ средствомъ пакля, по возможности, глубже вдавливается въ отверстія. Внимательный конюхъ рѣдко, однако, принужденъ будетъ прибѣгать къ этому средству, такъ какъ заблаговременно постарается устранить первые признаки гніенія посредствомъ надлежащаго ухода за копытами помощью хорошей подстилки, соотвѣтствующей ковки и усиленнаго движенія лошадей на сухой почвѣ.

Запущенное гніеніе стрѣлки можетъ переходить, по словамъ Мёллера, въ ракъ стрѣлки.

Твердые, хрупкія копыта вслѣдствіе большой сухости своей роговой массы не отличаются достаточною плотностью составныхъ частицъ, вслѣдствіе чего, при малѣйшемъ поводѣ, отъ стѣнки отламываются куски.

Этимъ недостаткомъ чаще всего отличаются маленькія копыта чистокровныхъ лошадей. Онъ представляетъ также обычное явленіе на сжатыхъ копытахъ, причемъ чаще на переднихъ, чѣмъ на заднихъ.

Причины: врожденность, неправильный ростъ рога, дурной уходъ за копытами, въ особенности слишкомъ сухое содержаніе ихъ, уничтоженіе глазури при неумѣренномъ пользованіи рашпилемъ, ломка подковы, болѣзненное состояніе вѣнчика и мясной стѣнки, продолжительное стояніе лошади на разгоряченной подстилкѣ и т. д.

Лѣченіе. Какъ показываютъ вышеизложенныя причины, для исправленія хрупкихъ копытъ нужно, прежде всего, стремиться къ тому, чтобы возвратить копытному рогу его первоначальную мягкость и упругость. Достигается это легче всего постояннымъ примѣненіемъ смягчающихъ ножныхъ ваннъ. Постоянное влажное содержаніе копыта можетъ быть легко достигнуто примѣненіемъ англійскихъ копытныхъ чехловъ изъ войлока (рис. 185), которые и надѣтые на копыто, могутъ быть смачиваемы. То же самое относится къ „Patent metallic soaking boot“, снабженному губкой (рис. 186). Послѣ этого смачиванія, тщательно смазываютъ копыто вазелиномъ.

Ковать слѣдуетъ такимъ образомъ, чтобы подкова, по возможности, равномерно прилегала къ копыту. Подкова должна быть легка, сдѣлана, лучше всего, изъ стали и прикрѣплена тонкими гибкими гвоздями.