

соблюдать большую осторожность, чтобы въ копытѣ не осталось куска или осколка инороднаго тѣла. Поэтому нужно вытаскивать гвоздь, или что бы то ни было, въ обратномъ направленіи тому, въ какомъ оно проникло въ копыто. Вполнѣ понятно, что вытащенное постороннее тѣло не должно быть выброшено, но показано ветеринарному врачу. Специалистъ часто по формѣ и наружному виду попавшаго въ копыто гвоздя можетъ сдѣлать вѣрныя заключенія о характерѣ образовавшейся раны. Слѣдуетъ также упомянуть, что ржавые гвозди часто причиняютъ упорныя и злокачественныя нагноенія. Когда уколочій предметъ извлечень, то копыто хорошо расчищается, весь мертвый рогъ съ подошвы и стрѣлки удаляется, рогъ въ окружности укола утончается, все копыто дезинфицируется ванной (сулемовой 1: 1000, карболовой 3%, или креолиновой 4%); рана присыпается іодоформомъ, нафталиномъ и т. п. и покрывается ватой или паклей. Подкова при этомъ дѣлается съ пластинкой.

Если выражены признаки воспаления, можно примѣнить холодъ въ видѣ компрессовъ, снѣга и т. п. Еще удобнѣе обыкновенныхъ компрессовъ, при лѣченіи водой, изображенный на рис. 189 А. Б. резиновый приборъ. Приборъ этотъ состоитъ изъ резинового мѣшка съ крѣпкимъ дномъ; мѣшокъ надѣваютъ на больную ногу, наполняютъ водой и пристегиваютъ. Такимъ образомъ, лошадь стоитъ по запястье въ водѣ, не будучи стѣсняема въ своихъ движеніяхъ. Такіе приборы, употребленіе которыхъ можетъ принести большую пользу при лѣченіи и другихъ болѣзней копытъ и сухожилій, приобрѣтаются въ резиновой фабрикѣ братьевъ Саксъ въ Берлинѣ, (Neustädtische Kirchstrasse 1). Изобрѣтены они г. Нейсомъ старшимъ.

Если описанное лѣченіе по прошествіи 3—4 дней не даетъ никакихъ результатовъ, то слѣдуетъ ожидать нагноенія, и лѣченіе должно быть передано ветеринарному врачу. До его прибытія слѣдуетъ дѣлать ножныя ванны изъ теплой воды.

Наминками называютъ ушибы мясныхъ частей подошвы черезъ неповрежденную роговую подошву. Такой ушибъ сопровождается кровоизліяніемъ между мясными и роговыми частями, причемъ кровь проникаетъ въ рогъ и образуетъ красноватая пятна, которыя обнаруживаются при расчисткѣ. Иногда, особенно если ущемленіе сильное и продолжительное, можетъ образоваться нагноеніе.

Наминки встрѣчаются чаще всего на внутренней сторонѣ передняго копыта.

Причины заключаются частью въ особомъ расположеніи копыта къ наминкамъ, частью въ случайныхъ внѣшнихъ вліяніяхъ. Къ первымъ относятся: неравномѣрное давленіе тяжести вслѣдствіе неправильной постановки ногъ, слишкомъ слабыя сжатая пятки, сжатое копыто, плоское, косое копыто, ломкія, хрупкія копыта.

Случайныя внѣшнія причины слѣдующія: высокіе шипы, неправильная расчистка, особенно чрезмѣрное снятіе пятокъ и стрѣлки, вырѣзываніе заворотныхъ стѣнокъ, неодинаковая расчистка пятокъ, неправиль-

наяковка (слишкомъ узкія или короткія подковы, скошенная внутрь верхняя поверхность, слишкомъ плотно притянутая подкова, рѣдкая перековка и т. д.), наконецъ, продолжительная работа на мостовой или слишкомъ твердой почвѣ. Достоинно вниманія, что некованныя лошади при тщательномъ уходѣ за ихъ копытами рѣдко страдаютъ наминками.

Вѣрнѣйшимъ мѣриломъ при опредѣленіи наминокъ является вызываемая ими хромота. Если хромота незначительная и лошадь не щадитъ при этомъ ноги, то беспокоиться нѣтъ основанія. Наминки, сопровождающіяся значительной хромотой, слѣдуетъ, напротивъ, считать опасными. Вообще же извѣстно, что лошади, страдающія наминками, не пригодны для быстрой работы по мостовой и по твердой почвѣ.

При лѣченіи должно, конечно, стремиться, прежде всего, къ тому, чтобы устранить причины. Если таковыя заключаются въ неравномѣрномъ обремененіи пяточныхъ стѣнокъ, то дѣйствительнымъ средствомъ является соотвѣтствующая расчистка. Если же, напротивъ, наминки образовались вслѣдствіе тонкихъ или сжатыхъ пятокъ, то на подковѣ необходимо сдѣлать горизонтальную верхнюю поверхность и снять съ больныхъ пятокъ рашпилемъ такое количество рога, чтобы между ними и подковой образовалось пространство, приблизительно въ 1 милл. Въ тѣхъ случаяхъ, когда наминки произошли вслѣдствіе склонности пяточныхъ стѣнокъ расширяться, на примѣръ, на плоскихъ копытахъ, верхняя поверхность не должна быть горизонтальна, но, наоборотъ, нѣсколько скошена внутрь. Дальнѣйшее лѣченіе рѣдко бываетъ необходимо, особенно если лошадь не хромотаетъ, какъ большею частью бываетъ при сухихъ, не гнойныхъ наминкахъ; во всякомъ случаѣ за копытомъ долженъ быть тщательный уходъ, и его должно размягчать. При незначительной хромотѣ примѣняются, кромѣ того, холодные компрессы.




Рис. 190. Круглыя подковы для копытъ съ наминками.

Значительная хромота, а также сильно повышенная температура и боль въ заднихъ частяхъ копыта указываетъ на присутствіе гноя, и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ позаботиться объ его удаленіи. Разумѣется, операція эта можетъ быть поручена только ветеринарному врачу, и только въ крайнемъ случаѣ (времени терять нельзя!) къ ней приходится приступать самому хозяину неспециалисту. Опредѣляется мѣсто гнойника легкими постукиваніями твердымъ предметомъ или пробирными щипцами по подошвѣ. На чувствительномъ мѣстѣ рогъ подошвы вырѣзается копытнымъ ножомъ до мясныхъ частей, гной выпускается и послѣ дезинфекціи рана закрывается повязкой.




Рис. 189. Освѣжающій аппаратъ.